

Внебольничная пневмония – это острое воспаление легких, которое возникло вне медицинского учреждения (во внебольничных условиях), либо диагностированное в первые двое суток (48 часов) с момента доставки больного в стационар.

Инфекция передается воздушно-капельным путем (при дыхании, разговоре, кашле, чихании).

Источником инфекции является больной человек или носитель возбудителя.


Вызвать воспаление легочной ткани могут различные инфекционные агенты:

- ✓ бактерии,
- ✓ вирусы,
- ✓ грибы,
- ✓ простейшие.

К основным симптомам пневмонии относятся:

- лихорадка (температура 38-40 °C),
- кашель (выделение мокроты),
- боль в грудной клетке,
- одышка,
- немотивированная слабость,
- утомляемость.

Факторы риска пневмонии развития



Пневмония относится к тем опасным заболеваниям, которые легче предупредить, чем после заниматься изнурительным лечением!

Неспецифические меры профилактики пневмонии

- здоровый образ жизни, отказ от курения и алкоголя, сбалансированное и рациональное питание.
- соблюдение правил личной гигиены, режимов уборки и проветривания помещений.
- закаливание. Закаливающие процедуры укрепляют иммунную защиту и повышают сопротивляемость организма любым инфекциям.
- укрепление иммунитета.
- необходимо избегать переохлаждений.
- занятия дыхательной гимнастикой, которая направлена на улучшение вентиляции легких.
- излечение хронических очагов инфекции.
- ограничение контакта с больными.
- В случае заболевания, не стоит идти на работу или вести ребенка в сад, школу**, так как можно заразить людей находящихся в контакте.
- Не занимайтесь самолечением!**
- Вызовите врача на дом или обратитесь за медицинской помощью в медицинское учреждение.